

Evidence A

改訂 增補版

本草學

慶熙大學校 漢醫科大學
本草學教室

漢醫學博士 李尚仁 著

學 林 社

弱이 虛弱하여 他動하는 者, 熱이 不快하고 不混하는 者, 傷寒中風에 太陽證이 陽明에 아직 傳經되지 않은 者, 傷寒 7~8 일에 邪가 裏結하여 候屎가 있고 往來寒熱 하여 牙痛하 不名者, 鼻氣에 濁을 泄하여 洩하고 脾胃가 甚히 弱된 者, 傷邪가 陽明에 있지 않고 不渴한 者, 産後에 寒熱이 血虛로 因하였거나 或은 惡露不盡한 者, 骨蒸勞熱이 陰精不足에 由하고 外感은 由하지 않은 者는 모두 服用을 大忌하고 만일 內傷陰虛에 斑疹이 나타난데 誤用하면 死亡이 反掌과 같다.

配合例

- ① 石膏에 黃連을 配合하여 傷寒發狂을 治하고
- ② 寒水石을 配合하여 痰熱喘嗽을 治하고,
- ③ 防風, 白芷, 細辛을 配合하여 水煎하여 胃火牙痛에 含漱하고 (或은 作末하여 每日 擦牙 亦可)
- ④ 黃丹, 龍骨, 兒茶酸을 配合하여 刀瘡瘍漏에 傅하고,
- ⑤ 川芎, 甘草를 配合하여 作末하고 葱湯에 調下하여 風邪眼寒과 頭痛鼻淚를 治하고,
- ⑥ 朱砂, 樟腦를 配合하여 上腦有熱, 口瘡咽喉을 治하고
- ⑦ 牡蠣粉을 配合하여 衄血을 止하고,
- ⑧ 葛根, 生薑을 配合하여 飲酒過多, 大酸難醒을 治하고,
- ⑨ 茯苓, 梔子, 知母, 生地黃, 竹葉을 配合하여 膀胱實熱, 腰背痛, 舌乾咽腫을 治하고,
- ⑩ 生地黃, 白芍藥, 牛膝, 知母, 麥門冬을 配合하여 身熱, 口渴, 牙痛, 頭痛을 治하고,
- ⑪ 竹茹, 桂枝, 甘草, 白薇을 配合하여 病後陰熱, 未清欲吐를 治하고,
- ⑫ 升麻, 知母, 大黃, 山梔子, 薄荷, 赤茯苓, 蓮翹, 朴硝, 甘草를 配合하여 胃火牙痛을 治하고,
- ⑬ 蔓本, 白朮, 甘草(炙), 白茯苓을 配合하여 頭風患眼을 治하고,
- ⑭ 麻黃, 杏仁, 桂枝를 配合하여 太陽中風 不汗出而煩燥를 治한다.

代 赭 石

Ocherum Rubrum

(異名: 土朱, 硃石, 硃朱)

基 源: 天然의 紅色鐵質의 變種인 輝鐵礦에 粘土를 混合하여 土狀을 이루었다.

形 態: 帶紫黑褐色의 光澤이 있는 重한 塊狀 或은 纖維狀을 이루고 所謂代赭色의 粉霰은 被하고 不齊한 瘤狀의 突起가 있다. 質은 堅硬하며 이것은 破碎하면 그 断面은 介殼狀을 보이고 金屬의 光澤을 發한다.

代赭石에는 半結晶者등 赤鐵礦結石이라 하고 結晶者를 輝鐵礦結石, 表面이 皮膜狀으로 된것은 釘頭代赭石이라 하였다. 全이 藥用으로 쓴다.

産 地: 中國의 廣東, 順德, 龍川 및 河北, 湖南, 山東, 山西, 五臺, 四川等地에서 産한다.

成 分 : 酸化鐵 Fe_2O_3 과 粘土로 되어 있다.

性 味 : 性은 寒無毒하고 味는 苦하다.

歸 經 : 入肝, 心包二經 (鎮虛逆 養陰血之品)

主 治 : 除血熱, 治吐衄崩帶, 胎動難產, 翻胃噎膈, 哮喘有聲, 金瘡長肉.

解 說 : 代赭石은 地中の 陰氣를 裹하고 生하였는데 陰에 屬한다. 性이 降하고 陰血을 養하고 虛逆을 鎮하는 要藥이 된다.

按전대 本品은 鎮逆 收斂, 止血劑로서 中極神藥을 鎮靜케 하므로 止嘔吐의 効가 있고 그 鐵質은 血에 入하여 能히 血色素의 新生을 刺激하여 이로 말미암아 補血의 効가 있으므로 오르지 逆氣, 噯氣, 胃病, 嘔吐, 懷孕嘔吐를 治하여 特效가 있고 兼하여 止嘔 止帶, 止衄, 補血의 作用이 있어서 吐血, 衄血, 咯血, 腸出血, 子宮出血, 慢性痢疾, 白帶 등을 治하고 또 小兒驚風에 使用하여 鎮靜安神하는 効가 있다.

修 治 : 火煅하여 醋에 二次 淬한 後에 研細水飛하여 使用한다.

用 量 : 12~40g

禁 忌 : 小兒慢驚과 陽虛陰痿와 下部虛寒者는 服用을 忌하고 外感寒熱者, 急性氣管炎 및 熱病初期에는 服用을 禁한다.

配合例

- ① 代赭石을 青礬, 煅石, 荆芥를 配合하여 研末하여 蜜水에 調服하고 仍하여 傳하여
- ② 桂枝, 生薑을 配合하여 嘔吐, 惡寒을 治하고,
- ③ 枳實, 厚朴을 配合하여 嘔吐, 傷風便閉을 治하고,
- ④ 瓜蒌仁, 薤白, 貝母를 配合하여 嘔吐, 痰多, 胸悶을 治하고,
- ⑤ 木香, 白豆蔻, 人參을 配合하여 嘔吐, 痰多, 胸悶을 治한다.

密 蒙 花

Buddleiae Flos

(異名 : 水錦花, 寒不凋)

基 源 : 馬錢科(아전과 Loganiaceae)에 屬한 常綠喬木인 밀몽수의 花蕾를 乾燥한 것이다. 나무의 높이는 1m이며 작은 가지는 圓筒狀으로 絨毛가 密生하였다. 잎은 柞圓形 或은 線狀披針形으로 全緣 或은 작은 鋸齒를 가지고 있다. 表面은 灰白色의 柔毛가 있고 背面에는 白色 或은 淡褐色의 柔毛가 있다. 겨울에 不凋하고 冬芽紫와 같이 腐하여 花色은 紫色을 띠고 香氣가 있다.

學 名 : *Buddleia officinalis* Maximowicz

形 態 : 本品은 小瓶狀花은 이루고 길이가 1cm, 幅이 2mm 内外이다. 筒狀部에는 類白色 絹絲狀의 獸毛은 密生하고 花蕾은 細小한에 類褐色이다.

產 地 : 中國의 湖北, 四川, 陝西, 河南等地에서 產한다.

成 分 : Buddleagluco-side $C_{22}H_{34}O_{14}$ 를 含有하였다.

性 味 : 性은 平微寒無毒하고 味는 甘하다.

歸 經 : 入肝經 (平潤之品)